

BRAZILIË

Atlantisch Regenwoud, Chapada dos Guimarães
en Pantanal

22 augustus – 6 september 2019



Chestnut-backed Antshrike, foto: Rob Strijker

Georganiseerd door:



**BIRDING
BREAKS**



Reisschema

Dag 1 – 22 augustus Amsterdam – Rio de Janeiro – REGUA

We beginnen onze reis laat in de ochtend op Schiphol, waar we met zijn zessen verzamelen voordat we inchecken. Vier andere medereizigers ontmoeten we bij de gate, ze komen uit het buitenland naar Schiphol toe. Na een lange maar rustige vlucht komen we aan in Rio de Janeiro, waar onze chauffeur op ons wacht. Die brengt ons na een anderhalf uur durende rit naar Reserva Ecológica de Guapiaçu, een privéreservaat in de foothills van het Atlantisch Regenwoud, ten noordoosten van Rio. Daar worden we warm onthaald met een op deze reis nog veel terugkerend drankje gemaakt van Braziliaanse rum of cachaça: caipirinha. We leren ook onze zeer scherpe lokale gids Adilei Carvalho da Cunha kennen, die is opgegroeid rond REGUA en elke millimeter van het gebied goed kent.



Guira Cuckoo, foto: Rob Strijker

Dag 2 – 23 augustus REGUA Wetlands Trail – REGUA akkers & savanne (98 soorten)

Het is al lastig om bij het ontbijt stil te zitten, want het is net licht en in een fruiting tree naast de lodge vallen de eerste leuke soorten van de reis, waaronder een paar algemene flycatcher-soorten en de lokale Golden-chevroned Tanager. Op de feeders een mooie Blond-crested Woodpecker en verschillende White-tufted Marmosets. We beginnen de reis na een heerlijk ontbijt in een open habitat om easy van start te gaan en volgen de naast de lodge gelegen Wetlands trail door een mozaiek van open landschap, wetlands en secundair bos. Bij de ingang van het hotel staat een boom in bloei, waar de grote Swallow-tailed Hummingbird zich uitgebreid laat bekijken. Een Ferruginous Pygmy-Owl kijkt geïnteresseerd toe. Enkele minuten later zien we ook een tweede uilensoort overdag: twee soezende Tropical Screech-Owls! We stoppen bij een wetland waar we heel snel de ene na de andere soort zien. Er vliegen verschillende reigersoorten rond, waaronder de Whistling Heron, die een geluid laat horen wat lijkt op een vrachtwagen die achteruit zet en de mooie Capped Heron. In de struiken rond het water zien we de endemische en schattige Yellow-lored Tody-Flycatcher, een paartje Rufous-winged Antshrikes en een Wing-banded Hornero. Een stel Capibaras ligt wat suffig rond zich heen te

kijken, terwijl ze bezocht worden door op hun rug foeragerende Pied Water-Tyrants en Yellow-headed Caracaras. Even verderop zien we Neotropical River Otter wegzwemmen en een paartje Planalto Tyrannulets duikelt boven ons door de kruiers. Een enorme groep Biscutate Swifts is indrukwekkend, maar leuker is een gemengd groepje tangaren, waaronder de flamboyante Brazilian Tanager. Tegen een beboste helling horen en zien we de endemische Yellow-eared Woodpecker. Voordat we het weten is het tijd voor de lunch en moeten we enigszins tegen onze zin aan de terugkeer beginnen. Zoals dat dan altijd gaat doen we er op de terugweg wel even over om in het hotel te komen omdat we worden opgehouden door een stel stiekeme Rufous-sided Crakes en een Blackish Rail die de weg oversteekt.

Nadat we dan toch eindelijk hebben geluncht en even hebben uitgerust, verkennen we de landbouwgebiedjes rondom Regua. In de velden staan mandioca (cassave) en taro, hoewel de meeste velden alleen voor rundvee worden gebruikt. Een White-browed Blackbird wordt uitgebreid gefotografeerd, net als een groepje excentrieke Guira Cuckoos. In de verte de eerste White Woodpeckers op een palmboom. Voor het donker gaan doen we een poging om Giant Snipe te vinden in een stukje intact grasland, maar de regen gooit helaas roet in het water. Wel zien van enkelen van ons Ash-throated Crake en een doorweekte Grassland Sparrow is de hekkensluiter van de dag. De caipirinhas doen ons dromen van Giant Snipe.

P.S. Jaçana (JASSANA), dus niet Jacana (JAKANA)☺



REGUA wetlands, foto: Siegfried Woldhek

Dag 3 – 24 augustus Green Trail – wetlands langs weg naar REGUA (127 soorten)

We proberen de dag vroeg te beginnen in de bossen van REGUA, maar onderweg naar de Green Trail worden we afgeleid door Burrowing Owls en, persoonlijk hoogtepunt van de reisleider, Yellowish Pipits. Eenmaal aangekomen bij de Green Trail is het relatief rustig, maar al snel vallen de eerste leuke soorten. Black-cheeked Gnateater is een bijzonder mooi vogeltje uit een heel bijzondere en relatief recent erkende familie. Man en vrouw laten zich uitgebreid bekijken en fotograferen. De Green Trail loopt door een van de beste stukken bos in de buurt van REGUA, met stukken primair woud. Dit is te zien aan de dikke bomen die op de helling van de berg staan. Een Rufous-capped Motmot speelt een spelletje met ons en laat ons behoorlijk op en neer rennen om de vogel fatsoenlijk te kunnen bekijken. Leuk langs de Green Trail zijn de vele flocks, waar we leuke soorten in vinden zoals Spot-billed Toucanet, Grayish Mourner, Silvery-flanked Antwren (recent afgesplit van White-flanked Antwren), Scaled Antbird en Yellow-green Grosbeak.



Black-cheeked Gnateater, foto: Rob Strijker

Bij een woudreus met enorme plankwortels eten we de lunch op. Echt rustig zitten we niet met alle vogels om ons heen en al snel staan we allemaal te eten terwijl we toekijken hoe een flock met Red-necked, Brassy-breasted, Gilt-edged en Green-headed Tanager over onze hoofden heen trekt. Een Golden-sided Euphonia is ook prachtig om te zien, maar de show wordt uiteindelijk gestolen door een Sharpbill die zich kort maar krachtig laat zien en een Swallow-tailed Cotinga die langdurend stil zit in een dode boom.

Bijna op het hoogste punt van onze route op de Green Trail vinden we een lek van de Blue Manakin, waar we de vogeltjes prachtig hun dansje zien opvoeren. De hele ochtend horen we ook al overal het 'klinggg'-en van de Bare-throated Bellbird, maar zien is lastiger bij deze soort. Uiteindelijk kunnen we een individu mooi bekijken door de telescoop terwijl deze in de verte zijn bizarre zang laat horen.

Omdat het inmiddels al behoorlijk stil is geworden in het woud dalen we terug af naar de jeep die ons naar de lunch in de lodge brengt. Daar genieten we van verschillende Braziliaanse gerechten, waaronder de altijd aanwezige arroz com feijão (rijst met bonen) en cassavefrietjes.

In de namiddag bezoekt een deel van de groep een wetland op enkele kilometers van de lodge. Hier weer een heel andere soortenset. Bij het uitstappen zien we direct de minuscule White-wedged Piculet. Ook de Streamer-tailed Tyrant, een spectaculaire tiran, steelt de show met een fascinerende begroetingsdisplay. Aan de rand van de wetland wachten we totdat het duister invalt. We horen Pauraque en Spot-tailed Nightjar roepen en even later zien we niet alleen Giant Snipe boven de wetland vliegen, maar ook South American Snipe. Laatste vogel van de dag is de Ice-cold Caipirinha.


P.S.2 Araçari (ARASSARI), dus niet Aracari (ARAKARI)©

Dag 4 – 25 augustus Carmo en omgeving (141 soorten)

Vandaag hebben we onze langste dagtrip vanuit Regua, naar een gebied aan de andere kant van de Serra dos Orgãos, waar door de regenschaduw een veel droger habitatype voorkomt. We doorkruisen de Serra met zijn spectaculaire rotsformaties en ons is door de chauffeur een heerlijk ontbijt beloofd in de bergen. Het ontbijt wordt echter steeds een Braziliaans kwartiertje later

geserveerd en naar blijkt zijn vandaag veel restaurantjes dicht vanwege een feestdag. Onze eerste vogelstop doen we dus op een lege maag. De locatie, struikgewas dicht naast een grote weg, lijkt in eerste instantie niet productief. Toch kunnen we al snel de zeer lokale endem Half-collared Sparrow bijschrijven, net als White-shouldered Fire-eye, een drietal Spinetails (Rufous-capped, Spix's, Pallid) en Orange-eyed Thornbird. Fantastisch! Even verderop zien we White-rumped Monjita op een draad naast de weg, net als de hier onverwachte Gray Monjita. Ook White-tailed Hawk laat zich prachtig zien, zittend en in vlucht. Uiteindelijk bereiken we dan toch een ontbijtplek, en genieten we van broodjes met koffie en typische pão de queijo (kaasbolletjes).

Boven Carmo ligt een stukje droog tropisch bos met enkele heel bijzondere lokale endemen. We lopen in de warme zon het bos in. Al snel zien we Hangnest Tody-tyrant en kleine groepjes Three-toed Jacamars, een van de sterren van deze plek. Net als de Jacamars zit er ook een paartje White-eared Puffbirds grote vliegende insecten te vangen. Gray Pileated-Finch is vrij algemeen en we zien ook Scaled Woodcreeper. Een andere topsoort laat op zich wachten en onze gids Adilei wordt al nerveus en begint al lichtjes te vloeken in het Portugees, maar even later zien we ook een prachtig zingend mannetje Serra Antwren.



Streamer-tailed Tyrants, foto: Siegfried Woldhek

Na de lunch en een korte plaspauze in het leuke dorp Carmo gaan we door naar een savannegebiedje niet ver buiten het dorp. We eindigen de dag daar met een 'kerstboom' met vier Toco Toucans, een Curl-crested Jay en twee verre Red-legged Seriemas. Net als gisteren sluiten we af met een prachtig zingende Ice-cold Caipirinha, voor degenen die diep genoeg in het glaasje keken, zelfs twee of drie.

Dag 5 – 26 augustus Pico da Caledônia (75 soorten)

Het Atlantisch Regenwoud kent veel endemen, maar om ze allemaal te zien is het nodig om verschillende hoogtezones te bezoeken. Bij REGUA bestaat de mogelijkheid om de hogere delen van de Serra dos Orgãos te bezoeken. Het kost wel wat geduld, want het laatste stuk naar boven is zo steil dat we met de jeep naar boven moeten, en daar kan maar ongeveer de helft van de groep in. Twee keer rijden dus; het duurt echter niet heel lang voordat de hele groep boven is en we kunnen vogelen. We gaan eerst helemaal naar boven, de paramozone in. Dit vereist een klimmetje, waardoor

een deel van de groep bij de auto blijft en ondertussen heel leuk White-throated Hummingbird fotografeert. De rest klimt omhoog en ziet mooie soorten als Green-crowned Plovercrest, Diademed Tanager en Velvety Black-Tyrant. Ook Rufous-backed Antwreos steelt de show door op nog geen meter van de groep open en bloot te zingen. De echte klapper valt echter uitkijkend vanaf een heliplatform. Ver in de diepte beneden ons verandert een klein geel vlekje in een boom na goed kijken in een zeldzame Gray-winged Cotinga! Helemaal bovenop de berg zien we Rufous-tailed Antwrens en horen we Mouse-colored Tapaculo in de bamboe.



Rufous-backed Antwren, foto: Siegfried Woldhek

We vervolgen de weg naar beneden en stoppen bij leuke soorten als Sharp-tailed Streamcreeper, Serra do Mar Tyrannulet en Bay-chested Warbling-finch. Enkelen van ons zien al Black-and-Gold Cotinga door de telescoop, maar de vogel is altijd snel weer weg. Dit maken we echter bij de laatste stop van de dag goed met een langdurige waarneming van een vogel in een fruitboom. Daar zien we ook Southern Yellowthroat en het lokale ras van Sharp-shinned Hawk.

Waarom Kinglet Calyptura nog steeds op onze lijst ontbreekt wijten we aan een overschot Ice-cold Caipirinhas.

P.S. # \$ @ % in de pap bestaan niet ☺

Dag 6 – 27 augustus Macaé de Cima – Waldenoor Trail (121 soorten)

Macaé de Cima is een inmiddels verlaten lodge op de flanken van de Serra dos Orgãos en biedt soorten die voorkomen in het middegebergte van de Atlantische regio. Eerst vogelen we op de toegangsweg, waar we leuke soorten als Dusky-tailed Antbird en de lokale Shear-tailed Gray-tyrant zien.

Na een rit in de jeep, de toegangsweg is behoorlijk ruw, komen we boven aan, waar het tot onze teleurstelling behoorlijk hard waait. Gelukkig ligt het grootste deel van de weg in de luwte, waardoor we toch nog leuk vogels kunnen kijken. Met een zonnetje erbij is het zelfs pleziering!

De eerste soorten die we zien zijn de echte bamboespecialisten Drab-breasted Bamboo-Tyrant en Bertoni's Antbird. Slaty Bristlefront en Hooded Berryeater laten zich horen, maar blijven jammer genoeg uit beeld. We vinden een leuke flock met naast goede aantallen Rufous-backed Antwreos ook White-throated Woodcreeper en White-collared, Buff-fronted en Buff-browed Foliage-gleaners. Green-winged Saltator en Greenish Schiffornis laten zich even verderop ook kort zien.

Onderweg naar beneden wordt het habitat steeds droger en zien we in een tuin een boom met bloemen met daarop de beeldschone Brazilian Ruby en White-throated Hummingbird. Diep in het dal zingt een Such's Antthrush zijn extreem lange lied en horen we de fluitjes van Brown Tinamou. Cinnamon Tanager, een specialiteit van ZO-Brazilië zit kort open en bloot in een dorre struik. Omdat het behoorlijk warm en stil aan het worden is, besluiten we naar de directe omgeving van REGUA te gaan, waar nog een vogelverrassing op ons wacht.

Na een tijdje rijden komen we aan op onze bestemming, de Waldenoor Trail, niet ver van de lodge, maar in een andere vallei als de lodge, dus nieuwe soorten. Ik zie opluchting op het gezicht van Adilei, de vogel waarop hij had gehoopt is aanwezig. Enkele seconden later ziet iedereen de slapende Long-tailed Potoo op de top van een boomstronk, een van de lastigere Potoo-soorten. Na intens te hebben genoten van deze gecamoufleerde verenbal, lopen we nog wat verder voor andere soorten. Een White-throated Spadebill laat zich lang bekijken en ook zien we weer een Swallow-tailed Cotinga. Yellow-fronted Woodpecker steekt af en toe zijn koppie uit een nestholte. Met Saw-billed Hermit hebben we meer moeite, de vogel steekt af en toe in sneltreinvaart de weg over, maar goed zien, ho maar! Toch wordt ook dit goedgemaakt en we kunnen de kolibrie uitgebreid zien poetsen in een struik.

Ice-cold Caipirinhas als hekkensluiter.



Long-tailed Potoo, foto: Rob Strijker

Dag 7 – 28 augustus reisdag (84 soorten)

We vliegen in de ochtend van Rio de Janeiro via Brasilia naar Cuiaba in de deelstaat Mato Grosso. Bij het vliegveld zien we over zee nog Magnificent Frigatebird en Royal Tern. De overstap in Brasilia duurt niet langer dan een paar minuten, de twee vliegtuigen staan pal naast elkaar! Alles verloopt vlekkeloos en 's avonds schuiven we aan bij het diner in het dorpje Chapada dos Guimarães, waarna we lekker gaan slapen.

P.S. Wel moet nog even een constatering van een van de deelnemers worden vermeld: Chapada dos Guimarães is een enorm $\$%^{\&}\text{gat}\text{©}$ Maar gelukkig zijn de vogels wel goed.

Dag 8 – 29 augustus Chapada dos Guimarães: Estrada da Geladeira & Veu da Noiva falls (97 soorten)

We beginnen heel vroeg, want de Chapada, onderdeel van het Braziliaanse savannebiom genaamd Cerrado, wordt al snel warm. Onderweg zien we Red-winged Tinamou op zijn gemak de weg oversteken. Hierna bevinden we ons op een lange zandweg met aan weerszijden intacte savanne. Al snel zien we enkele prachtige specialisten van het gebied, waaronder White-rumped Tanager en Shrike-like Tanager. Ook is Red Pileated-Finch een algemene maar spectaculaire verschijning. Een Swallow-winged Puffbird vangt insecten vanaf zijn hoge uitkijkpunt in een boom. Een luid gegrom op de savanne bleek helaas niet onze eerste jaguar te zijn, maar de buik van een van de deelnemers die protesteerde door de vele Ice-cold Caipirinhas van de afgelopen dagen.

Fabiano Oliveira, onze lokale gids, doet een Ferruginous Pygmy-Owl na en dit levert meteen een reeks aan soorten op, waaronder goede soorten als Large-billed Antwren, Pale-bellied Tyrant-Manakin en Forest Elaenia. Een Pheasant Cuckoo doet tot ieders verbazing meerdere malen een rondje over onze hoofden en laat zich zeldzaam goed zien voor de soort. Het wordt al snel warm maar het feest is nog niet afgelopen want ook verschillende papegaaiesoorten laten zich mooi zien, waaronder Red-and-Green Macaw, Red-shouldered Macaw en Peach-fronted Parakeet. Een drietal Great Dusky Swifts vliegt ook haastig voorbij.



White-rumped Tanager, foto: Rob Strijker

De lunch wordt genoten in een buffetrestaurant waar voor ieder iets te vinden is. Een ijsje als nagerecht gaat er ook wel in!

In de namiddag beginnen we vanwege de hitte wat later, maar wel op een spectaculaire plek, de Veu da Noiva watervallen. Bij aankomst mogen we meteen een Red-and-Green Macaw uitgebreid in de telescoop bekijken. Een paartje Narrow-billed Woodcreepers is toch wel erg bont voor deze groep meestal vooral roodbruine vogels. Cliff Flycatcher is in goede aantallen aanwezig rond de rotsen. Chestnut-eared Araçari, Green-billed en Toco Toucan kleuren het toch al kleurrijke landschap behoorlijk bij. Als dan ook een regenboog voor de waterval en een paartje Red-and-Green Macaws zich daaraan toevoegt is het plaatje compleet.

Dag 9 – 30 augustus Cidade de Pedra, Vale da Bencão, Aroe Jari Access Road (82 soorten)

Cidade de Pedra (letterlijk: stad van steen) is een spectaculaire kloof in de meer afgelegen delen van de Chapada. De toegangsweg is een lange, rulle zandweg en voor de veiligheid gaat er vandaag een extra voertuig mee om ons uit het zand te trekken mocht dat nodig zijn. De weg is op de heenweg tamelijk stil en dus zijn we snel bij de kloof met een fantastisch uitkijkpunt. Bij de kloof zien we heel mooi Rufous-winged Antshrike, een specialist van droge savanne. Op de terugweg blijkt het hulpvoertuig goed van pas te komen wanneer we vast komen te zitten in het zand. Ondertussen maar lekker vogels kijken, wat resulteert in een vrouwtje Horned Sungem! Even verderop zien we ook het mannetje. We moeten ook even werken voor de elegante Collared Crescentchest, maar even later zien we ook dit wonder van de evolutie, uit een heel bijzondere familie met slechts 4 soorten.

Het einde van de ochtend, wanneer het al behoorlijk warm is, brengen we door in een bosgebied genaamd Vale da Bencão, waar Fabiano kundig nog enkele soorten weet op te duikelen. Eerst de pijlsnelle Band-tailed Manakin, gevolgd door White-wedged Piculet en de zuidelijke migrant Chilean Elaenia. Bij een uitkijkpunt vindt een van de deelnemers een Brown Jacamar. Als afsluiter van de ochtend zien we nog een Sibilant Syristes.

In de namiddag bezoeken we een combinatie van open landbouwgebied en savanne. We zien hier eerst leuke aantallen Greater Rhea en Red-legged Seriema, net als Red Brocket Deer. In de savanne vinden we al snel een enkele Coal-crested Finch, die zich uitgebreid liet fotograferen. Voor het invallen van de avond vliegen er nog 12 Nacunda Nighthawks over! Op de terugweg zien we tussen de algemene Pauraques en Burrowing Owls nog een Little Nightjar.

P.S. Black-throated Saltators die op de grond foerageren zijn Black-throated Zandeters☺

Dag 10 – 31 augustus Chapada naar Pantanal (133 soorten)

Een reisdag, want vandaag vertrekken we naar de Pantanal. Toch hebben we nog wat werk te verzetten in de Chapada, want er ontbreken nog twee lokale specialiteiten. We stoppen eerst langs de hoofdweg ten oosten van Chapada. Hier staan we aan de rand van de tafelformatie en kijken uit over het rivierdal. Het habitat is grasland met verspreide struiken en een rotsachtige ondergrond. Onze zoektocht naar Blue Finch wordt niet makkelijk gemaakt door de harde wind. Na een half uur zoeken hebben we enkel nog maar een Rufous-collared Sparrow. Toch zetten we door. Vlak naast de weg horen we plotseling de hoge tonen van het roepje van Blue Finch, en niet snel daarna zien we een mooi mannetje! Ook de White-vented Violetear, welke door enkelen eerder werd gemist, liet zich ook mooi zien, dat was een goedmakertje! Missie 1 geslaagd!

Voor de volgende doelsoort rijden we een stukje volgroeide Cerrado in. Bij de eerste stop tapen we en horen we direct antwoord van een bijzondere soort, de Chapada Flycatcher. Niet lang daarna zien we een paartje dat displayt, met de vleugels hoog gehouden en lichte toppen aan de staartpennen, waardoor de soort verschilt van de bijna identieke maar veel minder bijzondere Suiriri Flycatcher. Missie 2 geslaagd!

We rijden snel door naar de Pantanal. De lunch wacht op ons bij onze volgende lodge, maar onderweg kunnen we al voor genieten van de enorme diversiteit van watervogels van het gebied en zien we de eerste Plumbeous Ibis, Buff-necked Ibis, Jabirus, vele Snail Kites en Savanna Hawks, net als de eerste van heel veel Paraguayan Caymans. Lunch wordt genoten in de Pousada Pouso Alegre, waar men te kampen heeft met een stroomstoring, waardoor maar de helft van het licht werkt. Terwijl sommigen genieten van een welverdiende siesta, vermaken de fotografen in de groep zich bij een

voederplaats waar verschillende vogels van dichtbij te fotograferen zijn, zoals Toco Toucan, Yellow-billed Cardinal, Sayaca Tanager, White-tipped Dove, een drietal Cracidae (Chaco Chachalaca, Chestnut-bellied Guan en Bare-faced Curassow) en een nieuwsgierige Black-and-white Tegu, de Neotropische tegenhanger van de varaan.



Green Ibis, foto: Siegfried Woldhek

In de namiddag gaan we met een safarivoertuig de savanne rond de lodge op. Iedereen kijkt zijn ogen uit met de vele honderden reigers, ibissen, kaaimannen en capibaras. Tegen het duister bezoeken we een water hole, waar een moeder Lowland Tapir met jong rondstruint! Ook komen er twee soorten Piping-guans drinken, Red en Blue-throated, inclusief een individu met kenmerken van beide soorten, een waarschijnlijke hybride. Op de terugweg zetten we een van de vele roepende Spot-tailed Nightjars in de spotlight en we kunnen de soort leuk fotograferen.

Dag 11 – 1 september Pousada Pouso Alegre (138 soorten)

We hebben een wilde nacht achter de rug. De stroomstoring betekende dat sommigen van ons niet goed slapen omdat de airconditioner het niet deed. Dit was misschien maar goed ook, anders was men misschien niet wakker geweest om de Giant Anteater te zien die in de buurt van de lodge rondsjokte. Iedereen werd snel opgetrommeld terwijl ze al klaar waren om naar bed te gaan. Het dier kwam zo dichtbij dat we achteruit moesten stappen om het de ruimte te geven. De helft van de groep stond nauwelijks aangekleed in het bos!



Giant Anteater, foto: Siegfried Woldhek

Gelukkig had iedereen de volgende ochtend de kleren weer aan. Er is geen tijd voor gekkigheden wanneer knallers van soorten als de voor de Pantanal endemische Mato Grosso Antbird en White-lored Spinetail op het menu staan. Ook Sunbittern laat zich mooi zien en heel kort zien we Helmeted Manakin. Een hele leuke soort is ook Long-tailed Ground-dove, een lief duifje met mooie goudkleurige markeringen op de vleugels, dat in een monotypisch genus zit en ook nog eens bijna een endem is van Brazilië! Een stukje palmbos levert een luidruchtig groepje Black-fronted Nunbirds op, net als een recent gesplite Lafresnaye's Woodcreeper. Na een lange, warme wandeling gaan we in het safarivoertuig terug voor de lunch. Onderweg zien we Rufous Casiornis, een mooie rossig gekleurde flycatcher.

In de namiddag maken enkelen van ons een wandeling door het dichtste bos van de Pousada. Hier is het relatief stil, maar zien we toch Dull-capped Attila en Moustached Wren en horen we Plain Inezia. Op de terug weg zien we nog een enorme groep South American Coatis.

Dag 12 – 2 september Pousada Pouso Alegre naar Porto Jofre & house boat (145 soorten)

In de ochtend wandelen we rond in de omgeving van de lodge, waar we Pale-crested Woodpecker zien en eindelijk Red-billed Scythebill goed in zicht krijgen na verschillende schampschoten. Fabiano legt uit waarom de Brazilianen de Black-collared Hawk 'oude man' noemen, en direct daarop voegt de vogel daad bij het woord en laat zijn zeurende roep horen. Een Paraguayan Cayman gromt vervaarlijk in de plas direct achter ons.

Onderweg naar het zuidelijke deel van de Pantanal stoppen we in de velden van Porto Jofre, een groot, nat open gebied, met veel leuke soorten. In een bosje zien we al vrij snel een roestende Great Horned Owl. American Pygmy Kingfisher speelt een beetje met ons, en Cinereous-breasted Spinetail werkt beter mee. Ook de mooie Rusty-breasted Seedeater laat zich goed zien, net als Fuscous Flycatcher en Common Tody-Flycatcher. De fotografen vermaken zich met Vermilion Flycatcher.



Bare-faced Curassow, foto: Rob Strijker



Spot-tailed Nightjar, foto: Paul van Els

Bij aankomst in Porto Jofre begroet ons een anaconda op de rivieroever, wat een 'warm' onthaal! Na een korte rit in een speedboot komen we aan op ons verblijf voor de volgende dagen, een huisboot op de river de Cuiaba. Op de boot een bijzonder vogeltje dat we eerder al innig hebben leren kennen, de Ice-cold Caipirinha.

In de namiddag trekken we erop uit in de speedboot. Meteen hebben we succes, want binnen een half uur zien we een soezende Jaguar op de oever van de rivier en een groepje Giant Otters, waaronder eentje die een pantsermeerval probeert te ontleden. Tegen de schemer komen we tevreden terug bij de house boat, de Big Two van de Pantanal al de eerste middag binnen. Alsof het nog niet genoeg is, vliegt er ook nog een nieuwe nachtzwaluw, de Band-tailed Nighthawk, voorbij!



Greater Rhea, foto: Rob Strijker

Dag 13 –3 september house boat, Cuiaba River (118 soorten)

Deze ochtend staat weer in het thema van de Big Two, maar eerst worden we getrakteerd op een onvoorziene Big Third, wanneer twee zwemmende Lowland Tapirs worden gezien! Ze proberen wat knullig de oever op te komen met hun zware lijven. Dit is de vierde waarneming van de soort van de reis! De jaguars werken in het begin nog niet mee, maar uiteindelijk hebben we nog drie waarnemingen! Enkele leuke soorten vogels zien we op de zandbanken in de rivier, waaronder Collared Plover, Black Skimmer, Large-billed Tern en Yellow-billed Tern. Een exotische en gevaarlijke Waterbuffel kijkt ons briesend toe vanaf de oever. We voeren lange tijd rustig door een zijkreek van de Cuiaba, een hele rustgevende bezigheid.

In de middag bezoeken we een visserslodge aan de westkant van de house boat. Onderweg zien we een kolonie Black Skimmers op de oever, waaronder enkele individuen die met hun ondersnavel door het water klieven om voedsel te zoeken voor hun jongen. Eenmaal bij de lodge aangekomen verkennen we op ons gemak de tuin. Onze beste waarneming van de bizar mooie Hyacinth Macaw valt hier, met een vogel die een mogelijke nestholte inspecteert en die zich niets van ons aantrekt. Langs een landingsbaan voor kleine vliegtuigjes zien we veel seedeaters, en een nieuwe kolibriesoort,

de Gilded Hummingbird. Op de terugweg vele tientallen Band-tailed Nighthawks en spectaculaire Greater Fishing-Bats.



Giant Otter & Armored Catfish, foto: Siegfried Woldhek

Dag 14 – 4 september house boat naar Pousada Rio Claro (136 soorten)

Onze laatste ochtend op de rivier en we zoeken nog naar enkele specialiteiten van de zuidelijke Pantanal. We vinden een gezamenlijke slaappleaats van de Boat-billed Heron en een paartje Rusty-fronted Tody-Flycatchers. Een roestende Great Potoo is een leuke verrassing!

Toch is de leukste waarneming van de dag een Jaguar die rustig foeragerend vlak voor de boot in het water zwemt, over boomstammen klautert, en de oever opklimt, zo'n half uur lang! Vele foto's zijn genomen die ochtend!

Na vertrek werden we bovendien eerst getraakteerd op een mooie Indigo Snake en daarna op een groepje speelse Reuzenotters die door het water rolden, op de stoffige oever met elkaar worstelden en daarna lekker dicht tegen elkaar aan gingen liggen. Leuk was dat een Ringed Kingfisher de otters nauwlettend volgde om te kijken of ze vis opschikten uit het water. Toen de otters de oever opklommen vertrok de IJsvogel snel ook.

Op de terugweg naar het noorden en naar onze volgende lodge werd er goed doorgereden, behalve toen er een donkere morf Long-winged Harrier voorbij kwam gezweven. We moeten goed gebruik maken van onze laatste middag in de Pantanal, want de volgende ochtend hebben we een vroege start op weg naar huis.



Jaguar, foto: Paul van Els

In de middag maken we een boottocht door het krekensysteem bij de Pousada Rio Claro. We zoeken gericht naar enkele doelsoorten. De eerste, Golden-collared Macaw, valt al snel en wordt door velen gezien. De tweede, Agami Heron, valt wel, maar zorgt voor wat logistieke problemen omdat de inzittenden van een boot deze wel zien, maar van de andere boot niet. Dat wordt later door een tweede individu deels goedge maakt. Een Band-tailed Antbird is een leuke toevoeging voor de lijst. We genieten van de ondergaande zon boven de krekens, terwijl we uitzien naar onze laatste maaltijd in de Pantanal. Het enige dat dit mooie plaatje nog verstoort was een dikke, vette boomkikker die bij een van de deelnemers in de boot in de edele delen sprong. Uw trouwe reisleader heeft deze vakkundig verwijderd (en op naam gebracht) en is tot op de dag van vandaag getraumatiseerd.

Paul van Els, september 2019



Tapirs, foto: Paul van Els



Vlnr: Chestnut-bellied Guan (S. Woldhek), Adilei (P. van Els), Swallow-tailed Hummingbird (S. Woldhek), Hyacinth Macaw (R. Strijker), Fabiano (S. Woldhek), zonsondergang (S. Woldhek)



			23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4
1	Brown Tinamou	<i>Crypturellus obsoletus</i>		x	x	x	x								
2	Undulated Tinamou	<i>Crypturellus undulatus</i>							x	x	x	x	x	x	x
3	Small-billed Tinamou	<i>Crypturellus parvirostris</i>							x		x				
4	Red-winged Tinamou	<i>Rhynchotus rufescens</i>							x	x					
5	Greater Rhea	<i>Rhea americana</i>								x	x	x	x		x
6	Southern Screamer	<i>Chauna torquata</i>											x	x	x
7	White-faced Whistling Duck	<i>Dendrocygna viduata</i>	x												
8	Muscovy Duck	<i>Cairina moschata</i>	x								x	x	x		
9	Brazilian Teal	<i>Amazonetta brasiliensis</i>	x		x		x				x				
10	Southern Pochard	<i>Netta erythrophthalma</i>			x										
11	Chaco Chachalaca	<i>Ortalis canicollis</i>									x	x	x	x	x
12	Dusky-legged Guan	<i>Penelope obscura</i>		x	x	x	x								
13	Chestnut-bellied Guan	<i>Penelope ochrogaster</i>									x		x	x	x
14	Blue-throated Piping Guan	<i>Pipile cumanensis</i>									x	x	x	x	x
15	Red-throated Piping Guan	<i>Pipile cujubi</i>									x	x	x		
16	Bare-faced Curassow	<i>Crax fasciolata</i>									x	x	x	x	x
17	Wood Stork	<i>Mycteria americana</i>									x	x	x	x	
18	Jabiru	<i>Jabiru mycteria</i>									x	x	x	x	x
19	Plumbeous Ibis	<i>Theristicus caerulescens</i>									x	x	x	x	x
20	Buff-necked Ibis	<i>Theristicus caudatus</i>									x		x	x	x
21	Green Ibis	<i>Mesembrinibis cayennensis</i>									x	x	x	x	x
22	Bare-faced Ibis	<i>Phimosus infuscatus</i>									x				x
23	Roseate Spoonbill	<i>Platalea ajaja</i>									x		x	x	
24	Rufescent Tiger Heron	<i>Tigrisoma lineatum</i>	x		x			x			x	x	x	x	x
25	Agami Heron	<i>Agamia agami</i>													x
26	Boat-billed Heron	<i>Cochlearius cochlearius</i>													x
27	Black-crowned Night Heron	<i>Nycticorax nycticorax</i>		x				x					x	x	x
28	Striated Heron	<i>Butorides striata</i>	x		x			x			x	x	x	x	x
29	Western Cattle Egret	<i>Bubulcus ibis</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
30	Cocoi Heron	<i>Ardea cocoi</i>			x			x			x	x	x	x	x
31	Great Egret	<i>Ardea alba</i>			x			x			x	x	x	x	x
32	Capped Heron	<i>Ptilerodius pileatus</i>	x	x	x						x	x	x	x	
33	Whistling Heron	<i>Syrigma sibilatrix</i>	x	x				x			x		x	x	
34	Little Blue Heron	<i>Egretta caerulea</i>									x		x	x	
35	Snowy Egret	<i>Egretta thula</i>	x		x			x			x	x	x	x	x
36	Magnificent Frigatebird	<i>Fregata magnificens</i>						x							
37	Neotropic Cormorant	<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	x	x	x			x			x		x	x	x
38	Anhinga	<i>Anhinga anhinga</i>	x		x			x					x	x	x
39	Turkey Vulture	<i>Cathartes aura</i>	x		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
40	Lesser Yellow-headed Vulture	<i>Cathartes burrovianus</i>	x				x				x	x	x	x	x
41	Black Vulture	<i>Coragyps atratus</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
42	King Vulture	<i>Sarcoramphus papa</i>												x	
43	White-tailed Kite	<i>Elanus leucurus</i>							x		x				
44	Grey-headed Kite	<i>Leptodon cayanaensis</i>				x									
45	Hook-billed Kite	<i>Chondrohierax uncinatus</i>			x										
46	Swallow-tailed Kite	<i>Elanoides forficatus</i>							x	x				x	
47	Rufous-thighed Hawk	<i>Accipiter erythronemius</i>				x									
48	Bicolored Hawk	<i>Accipiter bicolor</i>	x												
49	Long-winged Harrier	<i>Circus buffoni</i>													x
50	Plumbeous Kite	<i>Ictinia plumbea</i>							x		x			x	
51	Black-collared Hawk	<i>Busarellus nigricollis</i>									x	x	x	x	x
52	Snail Kite	<i>Rostrhamus sociabilis</i>									x	x	x	x	x
53	Crane Hawk	<i>Geranospiza caerulescens</i>									x	x	x		

54	Savanna Hawk	<i>Buteogallus meridionalis</i>				x						x	x	x	x	x
55	Great Black Hawk	<i>Buteogallus urubitinga</i>					x					x	x	x	x	x
56	Roadside Hawk	<i>Rupornis magnirostris</i>	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	
57	White-tailed Hawk	<i>Geranoaetus albicaudatus</i>				x				x						
58	Zone-tailed Hawk	<i>Buteo albonotatus</i>														x
59	Red-legged Seriema	<i>Cariama cristata</i>				x		x		x	x					
60	Sunbittern	<i>Eurypyga helias</i>									x	x	x	x		
61	Sungrebe	<i>Heliornis fulica</i>													x	x
62	Rufous-sided Crake	<i>Laterallus melanophaius</i>	x													
63	Grey-necked Wood Rail	<i>Aramides cajaneus</i>									x	x	x	x	x	
64	Slaty-breasted Wood Rail	<i>Aramides saracura</i>	x				x	x	x							
65	Ash-throated Crake	<i>Porzana albicollis</i>	x	x								x				
66	Blackish Rail	<i>Pardirallus nigricans</i>	x	x												
67	Purple Gallinule	<i>Porphyrio martinicus</i>	x			x										
68	Common Gallinule	<i>Gallinula galeata</i>	x	x		x										
69	Limpkin	<i>Aramus guarauna</i>	x			x			x		x	x	x	x	x	x
70	Southern Lapwing	<i>Vanellus chilensis</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
71	Collared Plover	<i>Charadrius collaris</i>														x
72	Pied Plover	<i>Hoploxypterus cayanus</i>												x	x	x
73	Wattled Jacana	<i>Jacana jacana</i>	x	x	x			x			x	x	x	x	x	x
74	South American Snipe	<i>Gallinago paraguayae</i>				x										
75	Giant Snipe	<i>Gallinago undulata</i>				x										
76	Solitary Sandpiper	<i>Tringa solitaria</i>									x	x	x			
77	Spotted Sandpiper	<i>Actitis macularius</i>														x
78	Black Skimmer	<i>Rynchops niger</i>												x	x	x
79	Royal Tern	<i>Thalasseus maximus</i>						x								
80	Yellow-billed Tern	<i>Sternula superciliaris</i>												x	x	x
81	Large-billed Tern	<i>Phaetusa simplex</i>									x			x	x	x
82	Rock Dove	<i>Columba livia</i>				x		x	x							
83	Scaled Pigeon	<i>Patagioenas speciosa</i>							x		x					
84	Picazuro Pigeon	<i>Patagioenas picazuro</i>	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
85	Pale-vented Pigeon	<i>Patagioenas cayennensis</i>	x	x			x		x	x	x	x	x	x	x	x
86	Eared Dove	<i>Zenaida auriculata</i>									x	x				
87	Scaled Dove	<i>Columbina squammata</i>							x	x	x	x	x			
88	Ruddy Ground Dove	<i>Columbina talpacoti</i>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
89	Picui Ground Dove	<i>Columbina picui</i>									x	x	x			
90	Blue Ground Dove	<i>Claravis pretiosa</i>						x	x							
91	Long-tailed Ground Dove	<i>Uropelia campestris</i>										x				
92	White-tipped Dove	<i>Leptotila verreauxi</i>	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
93	Grey-fronted Dove	<i>Leptotila rufaxilla</i>		x	x	x										
94	Guira Cuckoo	<i>Guira guira</i>	x	x			x	x						x		x
95	Greater Ani	<i>Crotophaga major</i>	x	x	x			x			x	x			x	x
96	Smooth-billed Ani	<i>Crotophaga ani</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
97	Striped Cuckoo	<i>Tapera naevia</i>		x	x			x		x	x			x	x	x
98	Pheasant Cuckoo	<i>Dromococcyx phasianellus</i>							x		x					
99	Little Cuckoo	<i>Coccyzua minuta</i>												x	x	
100	Squirrel Cuckoo	<i>Piaya cayana</i>		x	x	x	x		x	x			x	x	x	
101	Tropical Screech Owl	<i>Megascops choliba</i>	x					x	x							
102	Great Horned Owl	<i>Bubo virginianus</i>												x		x
103	Ferruginous Pygmy Owl	<i>Glaucidium brasilianum</i>	x	x				x			x	x	x	x	x	x
104	Burrowing Owl	<i>Athene cunicularia</i>		x					x	x	x					
105	Great Potoo	<i>Nyctibius grandis</i>										x	x			x
106	Long-tailed Potoo	<i>Nyctibius aethereus</i>				x		x								
107	Nacunda Nighthawk	<i>Chordeiles nacunda</i>								x	x			x	x	
108	Band-tailed Nighthawk	<i>Nyctiprogne leucopyga</i>												x	x	x
109	Pauraque	<i>Nyctidromus albicollis</i>		x				x	x	x	x	x	x	x	x	x
110	Little Nightjar	<i>Setopagis parvula</i>									x					
111	Spot-tailed Nightjar	<i>Hydropsalis maculicaudus</i>		x								x				
112	Rufous Nightjar	<i>Antrostomus rufus</i>														x

172	Cream-colored Woodpecker	<i>Celeus flavus</i>									x	x	x		
173	Lineated Woodpecker	<i>Dryocopus lineatus</i>					x							x	
174	Crimson-crested Woodpecker	<i>Campephilus melanoleucos</i>						x				x			x
175	Southern Crested Caracara	<i>Caracara plancus</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
176	Yellow-headed Caracara	<i>Milvago chimachima</i>	x	x	x		x	x							
177	Barred Forest Falcon	<i>Micrastur ruficollis</i>					x								
178	American Kestrel	<i>Falco sparverius</i>			x				x	x				x	
179	Hyacinth Macaw	<i>Anodorhynchus hyacinthinus</i>									x	x	x	x	x
180	Red-and-green Macaw	<i>Ara chloropterus</i>							x	x					
181	Blue-winged Macaw	<i>Primolius maracana</i>			x										
182	Golden-collared Macaw	<i>Primolius auricollis</i>													x
183	Red-shouldered Macaw	<i>Diopsittaca nobilis</i>							x	x	x				
184	Nanday Parakeet	<i>Aratinga nenday</i>													x
185	Peach-fronted Parakeet	<i>Eupsittula aurea</i>							x	x	x	x		x	x
186	Blue-crowned Parakeet	<i>Thectocercus acuticaudatus</i>													x
187	White-eyed Parakeet	<i>Psittacara leucophthalmus</i>			x	x			x	x	x				
188	Maroon-bellied Parakeet	<i>Pyrrhura frontalis</i>		x		x	x								
189	Monk Parakeet	<i>Myiopsitta monachus</i>									x	x	x		x
190	Blue-winged Parrotlet	<i>Forpus xanthopterygius</i>			x										
191	Plain Parakeet	<i>Brotogeris tirica</i>	x	x	x		x								
192	Yellow-chevroned Parakeet	<i>Brotogeris chiriri</i>						x	x	x	x	x	x	x	x
193	Golden-tailed Parrotlet	<i>Touit surdus</i>		x											
194	Scaly-headed Parrot	<i>Pionus maximiliani</i>			x	x									x
195	Turquoise-fronted Amazon	<i>Amazona aestiva</i>									x	x	x	x	x
196	Orange-winged Amazon	<i>Amazona amazonica</i>	x		x							x	x	x	
197	Blue-bellied Parrot	<i>Triclaria malachitacea</i>	x												
198	Band-tailed Hornero	<i>Furnarius figulus</i>	x		x			x							
199	Pale-legged Hornero	<i>Furnarius leucopus</i>									x	x		x	x
200	Rufous Hornero	<i>Furnarius rufus</i>	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x
201	Chotoy Spinetail	<i>Schoeniophylax phryganophilus</i>												x	
202	Rufous-capped Spinetail	<i>Synallaxis ruficapilla</i>			x		x								
203	Cinereous-breasted Spinetail	<i>Synallaxis hypospodia</i>												x	x
204	Spix's Spinetail	<i>Synallaxis spixi</i>			x	x	x								
205	White-lored Spinetail	<i>Synallaxis albilora</i>										x	x		
206	Rusty-backed Spinetail	<i>Cranioleuca vulpina</i>													x
207	Pallid Spinetail	<i>Cranioleuca pallida</i>			x	x	x								
208	Yellow-chinned Spinetail	<i>Certhiaxis cinnamomeus</i>	x	x	x			x			x	x	x	x	x
209	Rufous-fronted Thornbird	<i>Phacellodomus rufifrons</i>		x	x										x
210	Greater Thornbird	<i>Phacellodomus ruber</i>										x	x		
211	Orange-eyed Thornbird	<i>Phacellodomus erythrophthalmus</i>			x	x									
212	Firewood-gatherer	<i>Anumbius annumbi</i>			x										
213	Grey-crested Cacholote	<i>Pseudoseisura unirufa</i>										x	x		x
214	Buff-browed Foliage-gleaner	<i>Syndactyla rufosuperciliata</i>						x							
215	Black-capped Foliage-gleaner	<i>Philydor atricapillus</i>		x											
216	Buff-fronted Foliage-gleaner	<i>Philydor rufum</i>		x			x								
217	White-collared Foliage-gleaner	<i>Anabazenops fuscus</i>					x								
218	White-eyed Foliage-gleaner	<i>Automolus leucophthalmus</i>		x											
219	Rufous-breasted Leaf-tosser	<i>Sclerurus scansor</i>		x			x								
220	Sharp-tailed Streamcreeper	<i>Lochmias nematura</i>				x									
221	Plain Xenops	<i>Xenops minutus</i>		x											
222	Streaked Xenops	<i>Xenops rutilans</i>	x	x				x							
223	Olivaceous Woodcreeper	<i>Sittasomus griseicapillus</i>		x	x			x		x					
224	White-throated Woodcreeper	<i>Xiphocolaptes albicollis</i>						x							
225	Great Rufous Woodcreeper	<i>Xiphocolaptes major</i>											x		
226	Straight-billed Woodcreeper	<i>Dendroplex picus</i>											x		x
227	Lesser Woodcreeper	<i>Xiphorhynchus fuscus</i>		x	x	x	x								
228	Lafresnaye's Woodcreeper	<i>Xiphorhynchus guttatoides</i>									x	x			
229	Narrow-billed Woodcreeper	<i>Lepidocolaptes angustirostris</i>							x		x	x			
230	Scaled Woodcreeper	<i>Lepidocolaptes squamatus</i>			x										

349	Swallow-tailed Cotinga	<i>Phibalura flavirostris</i>		x	x		x												
350	Rufous-browed Peppershrike	<i>Cyclarhis gujanensis</i>		x	x	X	x	x	x	x	x							x	
351	Chivi Vireo	<i>Vireo chivi</i>		x				x											
352	Rufous-crowned Greenlet	<i>Hylophilus poicilotis</i>					X	x											
353	Ashy-headed Greenlet	<i>Hylophilus pectoralis</i>																x	x
354	Purplish Jay	<i>Cyanocorax cyanomelas</i>																x	x
355	Curl-crested Jay	<i>Cyanocorax cristatellus</i>																x	x
356	White-winged Swallow	<i>Tachycineta albiventer</i>																x	x
357	White-rumped Swallow	<i>Tachycineta leucorrhoa</i>		x														x	x
358	Grey-breasted Martin	<i>Progne chalybea</i>																x	x
359	Brown-chested Martin	<i>Progne tapera</i>																x	x
360	Blue-and-white Swallow	<i>Notiochelidon cyanoleuca</i>	x	x	x	X	x	x											
361	Southern Rough-winged Swallow	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	x	x	x		x	x	x	x									
362	Black-capped Donacobius	<i>Donacobius atricapilla</i>																x	x
363	Thrush-like Wren	<i>Campylorhynchus turdinus</i>																x	x
364	Moustached Wren	<i>Pheugopedius genibarbis</i>																x	
365	Buff-breasted Wren	<i>Cantorchilus leucotis</i>																x	x
366	Fawn-breasted Wren	<i>Cantorchilus guarayanus</i>																x	x
367	Long-billed Wren	<i>Cantorchilus longirostris</i>																	
368	House Wren	<i>Troglodytes aedon</i>	x	x	x	X	x	x	x										
369	Masked Gnatcatcher	<i>Poliophtila dumicola</i>																x	x
370	Chalk-browed Mockingbird	<i>Mimus saturninus</i>	x	x	x	X	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
371	Rufous-bellied Thrush	<i>Turdus rufiventris</i>	x			X	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
372	Pale-breasted Thrush	<i>Turdus leucomelas</i>	x						x		x								
373	Creamy-bellied Thrush	<i>Turdus amaurochalinus</i>	x						x	x								x	
374	White-necked Thrush	<i>Turdus albicollis</i>					X												
375	Yellowish Pipit	<i>Anthus lutescens</i>																x	x
376	Hooded Siskin	<i>Spinus magellanica</i>																x	
377	Purple-throated Euphonia	<i>Euphonia chlorotica</i>																x	
378	Violaceous Euphonia	<i>Euphonia violacea</i>	x	x	x													x	
379	Orange-bellied Euphonia	<i>Euphonia xanthogaster</i>																x	
380	Chestnut-bellied Euphonia	<i>Euphonia pectoralis</i>																x	
381	Blue-naped Chlorophonia	<i>Chlorophonia cyanea</i>																x	
382	Southern Yellowthroat	<i>Geothlypis velata</i>																X	
383	Tropical Parula	<i>Setophaga pitaiyumi</i>																x	
384	Flavescent Warbler	<i>Myiothlypis flaveola</i>																x	
385	White-rimmed Warbler	<i>Myiothlypis leucoblephara</i>																x	
386	Golden-crowned Warbler	<i>Basileuterus culicivorus</i>																x	
387	Crested Oropendola	<i>Psarocolius decumanus</i>																x	x
388	Yellow-rumped Cacique	<i>Cacicus cela</i>																x	x
389	Red-rumped Cacique	<i>Cacicus haemorrhous</i>	x	x	x													x	x
390	Solitary Cacique	<i>Cacicus solitarius</i>																x	x
391	Orange-backed Troupial	<i>Icterus croconotus</i>																x	x
392	Campo Troupial	<i>Icterus jamaicai</i>																x	
393	Variable Oriole	<i>Icterus pyrrhopterus</i>																x	x
394	Chopi Blackbird	<i>Gnorimopsar chopi</i>	x	x	x													x	x
395	Scarlet-headed Blackbird	<i>Amblyramphus holosericeus</i>																x	x
396	Unicolored Blackbird	<i>Agelasticus cyanopus</i>																x	x
397	Chestnut-capped Blackbird	<i>Chrysomus ruficapillus</i>																x	x
398	Baywing	<i>Agelaioides badius</i>																x	x
399	Giant Cowbird	<i>Molothrus oryzivorus</i>																x	
400	Shiny Cowbird	<i>Molothrus bonariensis</i>	x	x	x	X												x	x
401	White-browed Blackbird	<i>Sturnella superciliaris</i>	x															x	
402	Bananaquit	<i>Coereba flaveola</i>	x	x	x	X	x	x										x	x
403	Rufous-collared Sparrow	<i>Zonotrichia capensis</i>																x	
404	Grassland Sparrow	<i>Ammodramus humeralis</i>	x	x														x	
405	Blue Finch	<i>Porphyrospiza caerulescens</i>																x	
406	Half-collared Sparrow	<i>Arremon semitorquatus</i>																x	

407	Red-crested Cardinal	<i>Paroaria coronata</i>									x	x					x
408	Yellow-billed Cardinal	<i>Paroaria capitata</i>									x	x	x	x	x		
409	Cinnamon Tanager	<i>Schistochlamys ruficapillus</i>					x										
410	Black-faced Tanager	<i>Schistochlamys melanopis</i>								x							
411	Hooded Tanager	<i>Nemosia pileata</i>			x			x									
412	White-rumped Tanager	<i>Cypsnagra hirundinacea</i>								x	x						
413	Black-goggled Tanager	<i>Trichothraupis melanops</i>			x		x										
414	Flame-crested Tanager	<i>Tachyphonus cristatus</i>		x													
415	Ruby-crowned Tanager	<i>Tachyphonus coronatus</i>	x				x	x									
416	White-lined Tanager	<i>Tachyphonus rufus</i>								x							
417	Silver-beaked Tanager	<i>Ramphocelus carbo</i>								x	x		x	x	x	x	
418	Brazilian Tanager	<i>Ramphocelus bresilius</i>	x		x		x	x									
419	Sayaca Tanager	<i>Thraupis sayaca</i>	x	x	x	X	x		x		x	x	x	x			x
420	Azure-shouldered Tanager	<i>Thraupis cyanoptera</i>		x			x	x									
421	Golden-chevroned Tanager	<i>Thraupis ornata</i>	x	x					x								
422	Palm Tanager	<i>Thraupis palmarum</i>	x	x	x					x			x			x	
423	Diademed Tanager	<i>Stephanophorus diadematus</i>					X										
424	Fawn-breasted Tanager	<i>Pipraeidea melanonota</i>							x								
425	Shrike-like Tanager	<i>Neothraupis fasciata</i>								x	x						
426	Green-headed Tanager	<i>Tangara seledon</i>		x	x		x										
427	Red-necked Tanager	<i>Tangara cyanocephala</i>		x													
428	Brassy-breasted Tanager	<i>Tangara desmaresti</i>		x			X	x									
429	Gilt-edged Tanager	<i>Tangara cyanoventris</i>		x													
430	Burnished-buff Tanager	<i>Tangara cayana</i>			x		X	x		x							
431	Swallow Tanager	<i>Tersina viridis</i>			x					x		x					
432	Blue Dacnis	<i>Dacnis cayana</i>	x	x	x			x	x	x	x						
433	Rufous-headed Tanager	<i>Hemithraupis ruficapilla</i>		x	x					x							
434	Yellow-backed Tanager	<i>Hemithraupis flavicollis</i>	x	x					x								
435	Chestnut-vented Conebill	<i>Conirostrum speciosum</i>	x		x				x								
436	Coal-crested Finch	<i>Charitospiza eucosma</i>										x					
437	Grey Pileated Finch	<i>Coryphospingus pileatus</i>				x											
438	Red Pileated Finch	<i>Coryphospingus cucullatus</i>								x	x	x					
439	Bay-chested Warbling Finch	<i>Poospiza thoracica</i>						X									
440	Saffron Finch	<i>Sicalis flaveola</i>	x	x	x	X	x		x	x	x	x	x	x			x
441	Blue-black Grassquit	<i>Volatinia jacarina</i>		x					x	x	x	x					
442	Plumbeous Seedeater	<i>Sporophila plumbea</i>									x	x	x				
443	Rusty-collared Seedeater	<i>Sporophila collaris</i>														x	x
444	Double-collared Seedeater	<i>Sporophila caerulea</i>			x			x			x						
445	White-bellied Seedeater	<i>Sporophila leucoptera</i>														x	x
446	Red-crowned Ant Tanager	<i>Habia rubica</i>		x													
447	Yellow-green Grosbeak	<i>Caryothraustes canadensis</i>		x													
448	Buff-throated Saltator	<i>Saltator maximus</i>								x	x	x					
449	Green-winged Saltator	<i>Saltator similis</i>							x								
450	Greyish Saltator	<i>Saltator coerulescens</i>														x	x
451	Black-throated Saltator	<i>Saltator atricollis</i>									x	x	x				
452	Ultramarine Grosbeak	<i>Cyanocopsa brissonii</i>			x												
	Bijsoorten																
453	Sint-Helenafazantje		x														
454	Huismus				x					x	x	x				x	
	ZOOGDIEREN																
1	Hooded Capuchin Monkey	<i>Sapajus cay</i>									x	x	x	x	x	x	
2	White-tufted Marmoset	<i>Callithrix jacchus</i>	x	x	x	X	x										
3	Black and Gold Howler Monkey	<i>Alouatta caraya</i>														x	x
4	Azara's Agouti	<i>Dasyprocta azarae</i>														x	x
5	Capybara	<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i>	x									x	x	x	x	x	
6	Giant Otter	<i>Pteronura brasiliensis</i>														x	x
7	Neotropical River Otter	<i>Lontra longicaudis</i>	x														
8	Crab-eating Fox	<i>Cerdocyon thous</i>									x		x	x	x		

9	Red Brocket Deer	<i>Mazama americana</i>								x	x	x	x		
10	Gray Brocket Deer	<i>Mazama gouazoubira</i>											x		
11	Marsh Deer	<i>Blastocerus dichotomus</i>											x		
12	Lowland Tapir	<i>Tapirus terrestris</i>	x								x		x	x	x
13	South American Coati	<i>Nasua nasua</i>								x	x	x			
14	Giant Anteater	<i>Myrmecophaga tridactyla</i>								x					
15	Lesser Fishing Bat	<i>Noctilio albiventris</i>										x	x	x	x
16	Greater Fishing Bat	<i>Noctilio leporinus</i>											x	x	x
17	Jaguar	<i>Panthera onca</i>											x	x	x
18	Brown-throated Three-toed Sloth	<i>Bradypus variegatus</i>	x							x					
19	Brazilian Slender Opossum	<i>Marmosops paulensis</i>		x											
HERPETOFAUNA															
1	Green Iguana	<i>Iguana iguana</i>										x		x	
2	Yacare cayman	<i>Cayman yacare</i>								x	x	x	x	x	x
3	Broad-snouted Cayman	<i>Cayman latirostris</i>	x												
4	Black and White Tegu	<i>Salvator merianae</i>								x				x	
5	Amazonian Racerunner	<i>Ameiva ameiva</i>										x			
6	Paraguayan Cayman Lizard	<i>Dracaena paraguayensis</i>										x			
7	Collared Lizard	<i>Tropidurus torquatus</i>								x					
8	Yellow Anaconda	<i>Eunectes notaea</i>											x		
9	Indigo snake	<i>Drymarchon corais</i>													x
10	Chaco Tree Frog	<i>Boana raniceps</i>												x	
11	Map Tree Frog	<i>Boana geographica?</i>													x
12	Frog	<i>Scinax sp.</i>													x



foto: Siegfried Woldhek